

10 ATELIER FAF



Dr Antoine FAIX



Dr Pierre DESVAUX



Mireille Dubois-Chevalier

## MICROPENIS. Évaluation diagnostic et prise en charge.

FAF N° 150158008

**Expert :** Dr Antoine FAIX - Andrologue Urologue Sexologue - Secrétaire Général de l'AIUS  
Responsable de la commission androsexologie de l'AFU.

Dr Pierre DESVAUX - Medecin Sexologue -Président du SNMS.

**Animateur :** Dr M DUBOIS-CHEVALIER - Médecin - Sexologue.

**JEUDI 9 AVRIL 2015 de 9h00 à 13H00**

### JUSTIFICATIF :

Près d'un quart des hommes qui consultent en andro-sexologie se plaignent de la taille de leur sexe mais ont de la difficulté à en parler à leur MG. La réalité du micropénis est souvent méconnue et sous estimée il convient de faire le diagnostic des demandes irréalistes de ceux qui sous-estiment la taille du sexe et d'une réalité morphologique source de souffrance et d'une vie sexuelle difficile pour qui il existe des possibilités thérapeutiques.

Le micro-pénis est actuellement méconnu et sous-estimé et à l'origine de plaintes importantes mais souvent silencieuses. Ceci le plus souvent à partir de l'adolescence, et entraînant des désordres psychologiques importants et difficiles à prendre en charge à l'âge adulte. Lors de la petite enfance, l'appareil uro-génital masculin fait partie de l'examen systématique dès la naissance et régulièrement jusqu'à l'adolescence mais est le plus souvent axé sur les testicules et non pas sur la verge en dehors du prépuce, alors que des abaques existent sur la taille selon l'âge ; néanmoins, la taille de la verge n'est pas prise en considération la plupart du temps sauf plainte explicite de l'entourage ; les étiologies sont multiples à l'adolescence et la souffrance est le plus souvent silencieuse et rarement exprimée. Parmi les symptômes les plus fréquents à l'âge adulte figurent la plainte réelle de micro-pénis, mais aussi divers troubles psychologiques variables tels que le manque d'estime de soi voire un contexte anxio-dépressif, et également des troubles sexuels variés réactionnels alors que la taille de la verge se trouve dans la normale, et on peut parler à ce moment là de dysmorphophobie. La fréquence de ce symptôme exprimé est faible mais sous estimée dans la population comme l'ont suggéré certaines études.

### LES OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- Évaluer les connaissances sur la réalité du symptôme micro-pénis.
- Évaluer l'importance du dépistage dans la petite enfance et également les différents symptômes non spécifiques rencontrés à l'adolescence ou à l'âge adulte (dysmorphophobies, attentes irréalistes).
- Donner aux praticiens les outils d'un examen adapté et détailler les éléments d'interrogatoire et de bilan minimal à effectuer.
- Favoriser les outils thérapeutiques potentiels utiles en ce domaine, notamment les bases des traitements hormonaux et prises en charge chirurgicales et psycho-sexologiques.
- Connaître les paramètres décisionnels de prise en charge selon les recommandations internationales.

### Références :

Wessels H, Lue TF, McAnish JW. J Urol 1996 Sep ;156(3) :995-7 • Wiygul and Palmer. The scientific WorldJOURNAL (2011) 11, 1462-1469  
• Ponchiatti R, Mondaini N, Bonafè M, et al: Penile length and circumference: a study on 3300 young Italian males. Eur Urol 39: 183-186, 2001. • Trauma, Gender Reassignment, and Penile Augmentation • David Ralph, MD, Nestor Gonzalez-Cadavid, PhD, Vincenzo Mirone, MD Sava Perovic, MD Michael Sohn, MD, Mustafa Usta, MD, and Laurence Levine, MD • J Sex Med 2010;7:1657-1667

### INSCRIPTIONS

#### RENSEIGNEMENTS :

secretariat@aius.fr

Tél : 06 72 07 03 39

#### PIÈCES NÉCESSAIRES

##### POUR L'INSCRIPTION :

- Feuille de soins barrée.
- Attestation de règlement annuel de la cotisation FAF (URSSAF)
- Chèque de caution de 190 €
- Chèque d'adhésion à l'AIUS de 23€ (pour les non-membres)

#### A ENVOYER À :

Mlle MAQUIGNEAU A.  
76 rue LIANDIER  
13008 MARSEILLE